


上海市生猪业行业协会

上海市家禽行业协会

联合协办

【教你一招】



奶牛安全越冬

要加强饮水管理

冬季,由于青饲料供应少、质量低,使牛体内以料储水机制受阻,极易发生冷性脱水现象。这比盛夏热性脱水更为普遍和严重。因此,冬季不论是饲养奶牛、役用牛还是肉牛、孕母牛,如能根据牛的不同状况,分别饮生理调节水、营养滋补水、活血强骨水和益母安胎水,非常有益于牛的健康越冬和胎儿发育。其具体做法是

饮生理调节水

生理调节水既可以水降温,又可以水升温:

1.以水降温:冬季牛大量采食干料,很容易导致水料比率失衡,出现内火趋旺、体温升高,牛卧立不安、食欲减退、便秘尿烫等。可采取冷饮、导饮、拌饮等方法降温,经常供给充足干净冷水;每头成年牛每次用 0.3~0.6 公斤烧酒或 0.2 公斤尿素兑入 5 公斤冷水中,让牛闻味自饮;也可在投喂干稻草时提前一天将其置放清水中浸泡 3~5 小时,能很好地清除内火。

2.以水升温:冬季气候寒冷,对体况虚弱牛则应将清水烧熟至 40℃,按每公斤水掺入食盐 30~50 克或酱油 100 克后喂饮,也可用温热水拌料投喂,均可起到以热驱寒、增强食欲之功效。

饮营养滋补水

根据不同牛体状况分别投喂以下 3 种滋补水:

1.脂肪滋补水。将糠饼、花生饼、芝麻饼、棉籽饼、菜饼等脂肪类饲料研碎成粉,每牛日取 3~5 公斤,另加酒糟 2~4 公斤、碎草料 10 公斤、食盐 100 克、热水 15 公斤,拌匀喂牛。

2.蛋白滋补水。将豆饼(渣)按 1:10~15 的饼水比浸泡后投喂。

3.微量元素滋补水。可在饮水中放入微量元素,幼牛每头每日投喂锌 5~10 毫克、铁 6~12 毫克、钙 4~8 毫克、镁 10~15 毫克,连续投喂 1 个冬季,效果很好。

饮活血强骨水

活血强骨水常用的有两种:

1.祛风除湿汤:取枇杷叶 1 公斤、八桤枫 0.5 公斤、茅草根 1 公斤、橙皮 1 公斤,当归 20 克、白术 25 克、枸杞 30 克、百合 25 克、参须 20 克,同煎成汤,兑米酒 2~3 公斤,每日早、中、晚各喂一次,每次喂 1~2 公斤,一般饮用 15 日可康复。

2.强骨催膘汤:取鲜狗骨 1~2 公斤,或鲜山羊骨 2~3 公斤,或鲜猪排 3~5 公斤,清炖成骨汤 15~20 公斤,加入食盐 100~150 克,然后再将骨头烧成灰过筛拌入骨汤内,让牛每次饮 2~3 公斤,连饮一周即可。

我国城镇猪肉将全部来自定点屠宰企业

商务部日前发布消息称,商务部、公安部等六部门联合召开电视电话会议,部署打击私屠滥宰强化肉品卫生安全专项治理行动,将重点打击城乡接合部、偏远农村私屠滥宰违法行为,严防私屠滥宰肉品进入市场。要求到今年 6 月底,实现地级以上城市销售或使用猪肉全部来自定点屠宰企业;到今年年底,实现城镇猪肉全部来自定点屠宰企业。

去年底,商务部等六部门曾联合印发《关于深入开展打击私屠滥宰强化肉品卫生安全专项治理行动的通知》,决定在全国开展为期 10 个月的打击私屠滥宰强化肉品卫生安全专项治理行动。

商务部副部长姜增伟指出,私屠滥宰现象的存在,直接违反定点屠宰法律制度,严重影响

响法律严肃性,威胁着人民群众的身体健康。六部门此次联合进行私屠滥宰专项治理,是贯彻《食品安全法》等法律法规的必然要求,也是回应人民群众诉求的现实需要。

姜增伟强调,专项治理行动要突出重点,务求实效,对城乡接合部、行政区域交界地、偏远农村、主要交通道路周边、肉食品加工集中地等私屠滥宰多发的地区进行重点盯防、重点整治,严防私屠滥宰肉品进入市场。专项行动要加强与公安部“打四黑除四害”专项行动衔接,坚决打掉肉品生产经营“黑作坊”、“黑工厂”、“黑市场”和“黑窝点”。对治理中发现的、群众反映的“注水肉”、病害肉等其他问题,也要采取措施一并予以打击,实行综合治理,确保治理效果最大化。

姜增伟还强调,春节期间是肉品消费的高峰时期,也是肉品安全风险集中、问题易发的时期。各地区一定要将保障节日肉品安全作为头等大事抓紧抓好。

“从生猪生产到贩运、加工、销售,每一个环节都要严格监管。特别是在肉品的屠宰过程中,要加强检疫,确保所有肉品出厂都要得到检验检疫的合格证书。”姜增伟表示,今年 6 月底,要实现地级以上城市销售或使用猪肉全部来自定点屠宰企业;到今年年底,城镇猪肉全部来自定点屠宰企业。

目前,全国共有 18000 多家屠宰加工企业,投入不足、设备落后、监管不力是部分企业的现状。商务部门将在打击私屠滥宰的同时,对已备案的屠宰企业加强监管。

胡笑红

提高绒山羊冬羔成活率的几点措施

在绒山羊生产中,冬羔具有出生重比较大、抗病力强、成活率高、周岁体重大、产绒量高等优点,但初生羔羊的死亡率高。降低绒山羊冬羔死亡率主要应注意以下三方面:

环境、妊娠母羊及羔羊的管理。

- 环境
- 在产羔前应对圈舍、用具进行全面彻底地清理和消毒,对产羔圈舍垫草、铺撒草木灰、安装取暖设备,要求产房地面干燥、防寒保暖。初生羔羊各个器官发育尚不健全,抵御外界环境变化的能力弱,在产羔期内定期消毒、更换垫草,这可以预防羔羊肺炎和感冒等疾病的发生。接羔舍要保持良好的通风换气,接羔舍忌温度过高、过低(保持在 10℃左右为宜)及潮湿(潮湿的地面会诱发疾病),只有适宜的温度、湿度才能保证羔羊的成活率。
- 妊娠母羊的管理
- 冬季放牧
- 冬季放牧注重于保膘、保胎,严冬时顶风出牧、顺风收牧,出牧不宜太早,收牧不宜太晚。对妊娠母羊放牧速度宜慢,不跳沟、不惊吓,出入圈舍不拥挤,以利于羊群保胎。妊娠后期是胎儿发育最关键的时期,此时加强母羊的饲养管理对胎儿毛囊的形成、羔羊生后的发育和整个生产性能的提高都有利。
- 产后管理
- 母羊产后饮盐水熬皮汤,并将其乳房周

链接>>>

给绒山羊梳绒的技巧

绒山羊被毛由两层纤维组成,底层纤维是山羊绒,上层长毛是粗毛。梳绒时,绒山羊的绒开始由前到后有顺序地松动、脱绒。梳绒应在宽敞明亮的屋子里进行,场地要打扫干净,除掉一切污染物。梳绒工具:铁梳子分两种,一种是稀梳子,由 7~8 根钢丝组成,间距 2.0~2.5

厘米;另一种是密梳子,由 12~14 根钢丝组成,间距 0.5~1.0 厘米,钢丝直径为 0.3 厘米,梳齿的顶端为秃圆形。梳绒时可先剪去外层长毛,剪去长毛的长度,以不损伤绒毛为原则。先用稀梳子把被毛上的碎草、粪便顺毛方向由前到后,由上而下轻轻梳掉,随后用密梳子逆毛而

- 羔羊的管理
- 羔羊的饲养管理
- 初乳是羔羊出生 1~5 天可以得到的唯一营养物质,其所含的营养成分、免疫物质的量比常乳高得多,对羔羊一生的体质健康都意义重大。因此,羔羊出生后的 1 小时内就应当吃到初乳。羔羊吃上营养全面的初乳有利于胎便的排出,也有利于促进胃肠蠕动,并能使羔羊体内产生免疫力。由于新生羔羊一次吸乳量有限,所以每隔 2~3 小时应哺乳 1 次,生双羔的母羊应同时让两羔羊近前吸乳。羔羊 10 日龄就可以开始训练吃草料,以刺激消化器官的发育,促进心肺功能健全。羔羊 20 日龄后可随母羊一起放牧。1 月龄以后,羔羊逐渐转变为以采食为主,除哺乳、放牧采食外,应补给一定量的饲草、饲料。饲料要多样化,最好有豆饼、玉米、麸皮等 3 种以上的混合饲料,干草以优质苜蓿、青



割大豆等为主。羔羊断奶一般在 3~4 月龄,不超过 4 月龄。羔羊断奶后按性别、体质强弱分群放牧饲养。

- 疾病防治
- 疾病防治以注射疫苗为主,药物防治为辅。注射疫苗分直接注射和间接注射,注射后可使羔羊得到免疫力。初生羔羊的各个系统发育不健全,易患感冒、肺炎,所以除了做好圈舍及用具的消毒工作外,应对病羔隔离单独饲养,并做到一畜一消毒、更换垫草,做到早发现、早治疗,并进行药物预防。另外,应注意加强运动,羔羊 7 日龄后应让其慢慢地适应外界环境,这样可以提高羔羊的抗病能力和补充维生素 D。
- 通过以上措施,可以提高绒山羊冬羔的成活率,提高养殖效益。
- 王粉红

梳,按股、腰、背、胸、腹、肩部的顺序进行。梳子要贴近皮肤,但用力要均匀,不要用力过猛,以免伤及皮肤。梳绒的当天早晨羊要停止进食,梳绒后投给劣质干草或秸秆,采食一段时间后再次水。由于绒山羊的不同部位和不同个体之间的脱绒时间也略有差异。所以,第一次梳绒梳不净的羊,间隔一周后再梳绒一次,做到有绒必梳,梳绒必有效益。

雁香

冬季养猪温度调节很重要

温度对猪的生长发育和健康有着极其密切关系。因此,在猪的饲养管理中,注重对温度的管理与调节,为其创造适宜的生长发育温度,是促进其快速生长或育肥、能获得较高经济效益的必要保证。

环境温度 在外界气温过低时,猪体为了维持正常的体温,就必须增强体内物质的氧化分解,产生热能,以补充体热的散失。一般来说,小猪周围气温为 20℃~26℃时,代谢消耗量较低,生长发育正常。但大猪则以 15℃~20℃时代谢消耗较低,增膘正常。因此,要注意搞好猪舍的防寒保温工作(如猪舍上覆盖塑料薄膜等),

提高舍内温度,这样不但可以减少猪体代谢的消耗,而且还可以促进其生长发育和增膘。

饮水与食温 冬季猪的饮水和猪饲料的温度对猪的生长发育和健康也有密切的关系。一头哺乳母猪每天约需要 17.5~22.5 公斤水和猪饲料,如果水温、食温是 0℃时,要把这些水、食温度升高到体温 39℃的水平,猪体就要消耗 682~878 千卡的热能,也就等于每天需要 0.5~0.75 公斤的精制猪饲料白白消耗在维持体温上,而不能用于泌乳、生长发育和增膘。因此,在冬季喂猪时,要经常喂温食和温水,这样可以减少猪饲料消耗,提高饲养效益。

廖伟伟

猪采食量下降的调理方法

- 增加一点辣的
- 猪食欲不振时,喂点胡椒粉、辣椒等很有效。由于胡椒粉、辣椒含有辛味和香气,并有刺激性,猪食后能使胃肠分泌物增多,从而加速胃肠蠕动,提高消化能力。尤其是泌乳母猪在料中添加少许胡椒粉等,不仅可以增加母猪的采食量,还可以降低仔猪的发病率,促使仔猪提前断奶。
- 多喂一点甜的
- 在猪的饲料中加入适量的糖精,育肥猪爱吃,吃后膘肥体壮;哺乳母猪更爱吃,吃后食量增加,防止掉膘、瘦弱等现象,还可增加泌乳量;仔猪对甜味更喜欢,不仅能成活率高,而且断奶早,体重显

著增加。一般每千克饲料添加 150~200 毫克。有条件的在晚春、夏末、早秋加些白糖,早春、晚秋和冬天加些红糖,每千克饲料添加 1~3 克,效果比糖精好。

再来一点咸的

在猪日粮中添加适量的盐(每天不超过 6 克),能促进猪新陈代谢和生长发育,增加饮水量,改善饲料的适口性,增进食欲,帮助消化。

别忘添点酸的

每千克饲料添加食醋 10 毫升,搅拌均匀,不但猪爱吃,助消化,因醋含有氨基酸等营养成分,对猪生长发育很有益处,但添加量不宜过多。

河畜