

上海旺园家禽养殖专业合作社 以人为本，以德为先 创建国内一流的家禽科技企业

地址：奉贤区奉城镇卫季村 1154 号  
联系电话：021-57175121  
手机：13901659483

东方城乡报  
三农实用周刊  
面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

[教你一招]

秋季养羊注意事项

**科学放牧** 秋季天高气爽，中午炎热，早晚凉爽。放牧时应该坚持早出牧，晚收牧，中午避暑。有霜天放牧时要晚出晚归，以防止羊吃带霜的草。严禁在潮湿泥泞的地方放牧、休息，以免引起风湿症和食入寄生虫卵。羊饮水最好是洁净的井水或泉水，不要饮污水。羊爱吃洁净的草料，采食前总要先用鼻子嗅一嗅，宁可忍饥挨饿也不吃被其他羊只粪便污染、践踏的草料。

**抓好补饲** 为防止个别羊只吃不饱，夜间可适量补喂营养丰富、适口性好的精料，如玉米、饼类等，以促进长膘。特别是怀孕母羊每只每天应补料 0.5-1 公斤，哺乳母羊每只每天应补料 0.5-0.7 公斤，并根据膘情适当加减。

**抓好配种** 秋季母羊膘情好，发情正常，排卵多，易受胎，有利于胎儿发育，要抓好母羊的配种工作，一般秋季配种，春季产羔，以 9-10 月份配种为宜，来年 2-3 月产羔，母羊产羔后能很快吃上青草，有利于羔羊发育成长。

**分群管理** 秋季是山羊的配种旺季，公羊常追逐、爬胯母羊，如公母羊同群放牧、同栏饲养，常会因性活动的干扰而影响羊只吃草、休息，易造成怀孕母羊流产等现象，故宜将公母羊分群放牧。

**强化免疫** 秋季是羊各种疾病多发和流行的高峰季节，可有计划的对结核病等开展免疫接种，以预防传染病的发生。

**及时驱虫** 羊的寄生虫分内外寄生虫。驱除内寄生虫可选用丙硫苯咪唑，其具有高效、低毒、广谱的优点，对羊胃肠道线虫、肺丝虫、肝片吸虫和绦虫均有效。驱除外寄生虫可选用 0.1-0.2% 杀虫脒水溶液，或 1% 敌百虫水溶液等药物进行药浴，也可将羊放在大盆或大缸中逐只洗浴。

**搞好消毒** 对羊舍要勤打扫，保持羊舍内干燥清洁，定期对羊圈内(包括用具)、地面、粪便、污水等进行定期消毒，消灭外界环境中的病原，防止疫病的发生。

农技

[生猪行情]

肉猪价格(元/公斤)

闵行区:16.8  
嘉定区:16.4  
浦东新区:16.4-17.0  
奉贤区:15.8-16.7  
金山区:15.8  
崇明县:16.6  
长宁区:16.6

(本期是 2013 年 9 月 6 日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区:30.0  
浦东新区:25.0-28.0  
奉贤区:27.0

(本栏目信息由上海市生猪业行业协会提供)

本版由上海市生猪业行业协会协办

乳业兼并重组细则近期出台

两年将行业集中度提高到70%以上

乳业兼并重组细则近期一直牵动人心，细则出台后超 70 家乳企 5 年内将消失，6 成乳企将面临淘汰等言论纷纷。近日，工信部负责人明确表示乳业兼并重组细则将在 9 月出台。

此前，工信部消费品工业司副巡视员高伏在“全国食品安全宣传周”工信部主题日会议上表示，将推动乳粉企业间“强强联合，优势互补”的兼并重组，争取 2 年培育 10 家年销售收入超过 20 亿元的大型企业集团，将行业集中度提高到 70% 以上。细则中包括财政、税收、金融等政策，扶持建设大型乳企也将是政策重点。

有分析指出，审查细则意在扶优汰劣，重

振奶粉行业。审查细则称，奶粉生产企业，仅有包装场地、工序、设备，没有完整的生产条件，不予生产许可审查；以婴幼儿配方乳粉或基粉为主要原料生产婴幼儿配方乳粉，没有完整的干法工艺，不予生产许可审查。

对于企业管理制度审查，审查细则要求：以生乳为原料的生产企业，应有自建养殖场，确保生乳的质量安全。而以全脂、脱脂乳粉为原料的生产企业，应自控奶源。此次，还对奶粉生产企业研发能力制度要重点做审核。对于企业的研发能力，审查细则要求：婴幼儿配方乳粉生产企业应建立自主研发机构，配备食品相

秋季养猪注意控温

秋季对养殖户来说，是养猪的黄金时期。在这一阶段，猪上膘较快，如果养殖户注重合理的饲养，猪的增长会较为明显。在此介绍秋季养猪注意要点，希望对养殖户有所帮助。

●注重防寒

从炎热夏天到凉爽秋天，气温下降较大，昼夜温差更是达到 10℃，会对猪的生长带来一定的影响。所以应采取适当措施，控制好猪舍内的温度，掌握生猪及仔猪的最适宜温度。具体措施为：(1)修整好猪舍，把栏舍漏风的部位堵严，遮挡物可因地制宜用草苫或塑料薄膜等，以防冷风侵袭猪舍。(2)猪舍内勤垫干草，不要让垫草潮湿。(3)增加饲养密度，让猪挨着睡，既可互相取暖，又可提高栏温。多喂热能高的饲料，以增加猪体内的热量。(4)有条件的养殖户可以在猪圈内避风一角建温室，温室的大小可根据猪的多少而定。方法是：砌 1 米高左右的墙，留一小门让猪自由进出，上部用稻草盖严，内铺草。气温寒冷的时候，猪会自动进入保温室避寒。

●调整好营养

秋季养猪，除加强常规饲料管理外，还要做好猪饲料的储备和育肥催肥工作。随着秋冬季节的到来，要调整饲料配方，增加饲料营养，重点是增加能量饲料，提高猪的采食量，以更适用于猪的生长需要，红薯、花生秧、豆秸等粉碎后或发酵后喂猪都是很好的饲料。在饲喂方法上采取生料湿喂、单独饮水的方法，粉状配合料，按 1:1-1:1.5 的比例在喂前加水调制。建立定时和定量饲喂的生活制度。为促进消化提高饲料利用率和生长速度，育肥猪每天日粮可分 3 次定时饲喂，此外，猪的食欲一般是傍晚最盛、早晨次之、中午最弱，因此，在一日内每次的给料量大致可按早晨 35%、中午 25% 和傍晚 40% 的比例分配。

●严防饲料发霉

由于秋季多雨，饲料极易发霉，所以要把饲料的采购与贮存工作提到议事日程上来，严防饲料发霉。如果青饲料采收过多，储存加工不

当，很容易发生霉烂，堆积过久，青草内含的硝酸盐会形成有毒的亚硝酸盐，若猪吃了，会中毒或因严重缺氧而窒息死亡。

●注重猪舍空气质量

在对猪舍进行保温的同时，也要注意加强通风，防止空气污染。通风换气最有效的措施是在天棚顶上开个通风孔，这样不用开门窗就能尽快将舍内的大量潮气和不良气体排出，并换入新鲜空气。但通风要有节制，晴天多通风，阴天少通风，时间上要选择气温较高的时间进行通风，一般在上午 10 点到下午 3 点这段时间都是进行通风的最佳时间。

[链接]

秋季仔猪腹泻的预防

泻。而刚断奶的仔猪，受断奶应激的影响采食量减少甚至会拒食，引起饥饿性腹泻。

断奶前尽早补加教槽料

建议在断奶前每头至少补饲 600 克仔猪料，使仔猪在断奶前胃肠消化系统功能得以加强，以适应断奶后采食饲料尤其是植物性饲料，建立对饲料粗蛋白质的免疫耐受性，减少日粮抗原过敏反应。

加强哺乳母猪的饲养

提高哺乳母猪日粮的营养浓度，添加油脂提高能量水平，使用优质鱼粉、豆粕、肉骨粉提高粗蛋白的吸收利用率，添加复合氨基酸平衡各种氨基酸含量。不饲喂霉变饲料。

其他方面

仔猪在断脐、断尾、剪牙、剪耳等工作时，尽量减少应激，同时应充分消毒，避免细菌或病毒感染，注射足量的铁剂和维丁胶性钙。保持猪舍的清洁卫生，粪便要随时清扫，保持清洁干燥，不要用水冲洗。

南农

[实用技术]

蛋鸡补光方法

**光色应用合理** 光色不同，波长各异，对产蛋鸡的影响也不同。在其它饲养条件都相同的条件下，养在红色光线下的母鸡产蛋率比其它颜色光线下的母鸡产蛋率明显提高，一般可提高 2% 左右。  
**时长稳定得当** 给蛋鸡补充光照一般从 19 周龄开始，光照时间要由短到长，以每周增加半小时为宜。当每天的光照时间达到 16 小时时，应保持稳定光照，不能时长时短，最好的办法是每天早晚各补充一次光。

**光强均匀适宜** 对于正常的产蛋鸡，所需要的光照强度一般为 2.7 瓦。多层笼养鸡舍为使底层有足够的照度，设计时照度应提高一些，一般为每平方米 3.3 至 3.5 瓦。所以，鸡舍内安装灯泡应在 40 至 60 瓦为宜，一般灯高 2 米，灯距 3 米。鸡舍内如果安装两排以上灯泡，应交叉排列，靠墙的灯泡同墙的距离，应为灯泡间距的一半，还应注意随时更换破损灯泡，每周将灯泡擦拭一次，以使舍内保持适宜的亮度。

惠平

蛋鸡从育成期转入蛋鸡的过程称为转群。转群控制好，可使蛋鸡开产早，产蛋多。  
**时间要恰当** 蛋鸡一般在 20 周龄开产，为使鸡尽快熟悉环境，并形成和睦的群体，一般在 18 周龄即要转群，否则会影响产蛋量。  
**要预防应激** 转群工作冬季在暖和的中午进行，夏季在凉爽的早晚进行。转群前让鸡空腹，抓鸡、放鸡动作要轻。转群后 3 天~5 天饲料中加适量的抗菌素药物，以免鸡转换环境后不适应造成发病。

蛋鸡转群要注意

**要合理分群** 转群前对鸡进行检查，按鸡的大小分群，以便采取相应的管理措施。  
**饲养管理要衔接好** 鸡群产蛋率达 5% 时。要及时改喂蛋鸡饲料。改料须在育成期料中逐渐加入蛋鸡料，一周后改用蛋鸡料。从 19 周龄，每天光照 10 小时，从 20 周龄起每天增加光照半小时，直到每天 17 小时。  
**要加喂维生素** 转群后 3 天~5 天，在饲料中适量添加多种维生素，以增强鸡的抗病力。

中农