



源自大自然的馈赠

享受生活 选择丰美

绿丰果园 上海丰美果蔬专业合作社

地址：崇明县横沙乡贤贤南路 1068 号

电话：021- 56899531

手机：15026998996

联系人：陈先生

网址：www.fengmeishan.com

经营范围：

“真”开心土地领养；林地鸡鸭鹅；特色农家乐；各类绿色有机蔬菜、大米；田园风光游等等

坚持打造绿色原生态种植环境

“真”开心农田 诚邀你的加入



东方城乡报

三农**实用**周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

[热线答疑]

猕猴桃小树叶子发黄、树势不均衡,怎么办?

问:猕猴桃小树叶子发黄、树势不均衡,怎么办?

答:猕猴桃幼树定植后,由于栽培管理不善,常发生叶黄、落叶、树势生长不均衡等现象,严重时造成幼树成活率低、成园率不高,影响后期生产,应做好以下几方面工作:

定植
应在 12 月上旬之后至次年 2 月底以前定植。此期间定植的猕猴桃树缓苗期短、根系活动早、成活率高,生长也较旺。新栽苗木进行重剪,留 3~5 个芽。

地膜覆盖
在定植后,也可将定植带用白地膜覆盖起来,可以提高地温,促进早萌芽、早生长,提高成活率和生长量,有利于早成形、早结果。

肥水管理
(1)肥:猕猴桃在其年生长发育周期中,可抽梢 2~3 次以上。刚定植的幼树,其生长量的大小与肥水管理密切相关,为了保证旺盛生长,定植当年应确保 4~5 次追肥。第一次追肥在萌芽展叶后即进行,一般在 4 月中下旬,以后每隔 20 天左右追肥 1 次。最后一次追肥应在夏季高温到来之前完成。追肥时切不可离主干太近,以免烧苗。肥料以尿素等速效肥为主,每株全年施用尿素的总量在 200 克左右。每次施肥应在雨前或雨后进行,如在不下雨时施用必须要结合浇水。施肥要在离根部 20 厘米处施入。每次施肥量应视长势而定,掌握勤追薄追的原则,以免因施肥过勤过重或方法不当而造成死树的现象。

(2)水:幼树抗高温干旱的能力差,因此在高温干旱季节,应视旱情及时灌水,保证苗木不受干旱影响。在无雨情况下,一般每 10 天灌一次轻水,每 20 天结合追肥灌一次重水,雨水充足时须注意排水,不能使土壤处于积水状态。在连续雨天期间,应抢好天时候在树干周边松土,降低土壤湿度,并结合追肥,增强树势。

(3)病虫害预防:可使用广谱杀虫杀菌剂,结合叶面追肥混合喷施,也可结合肥水浇灌施用,两者可交替进行。切记施肥、浇水和叶面喷施要避开高温,在温度偏高、光照强的情况下,应在上午 10 点前、下午 4 点后或阴天进行。

引蔓
在茎部抽发的壮梢处,插杆引缚上架。植株长到约在 1.6 米高处摘心、定干。

修剪
春季抹除实生芽,夏季主要是引枝上架,除选择一条最壮枝条引缚外,其余抽发枝条全部在 20~30 厘米处摘心、平压,秋季所有枝条在细弱处剪断,以促进壮过冬。冬剪时,对于壮旺单干幼树可在 1.6 米处剪截,单干而有壮旺分枝的,则在分枝 3~5 个芽处剪截,弱树则应在离嫁接口 10~20 厘米处再次重剪。

越冬
春季定植苗可用杂草等物覆盖树盘以防寒。

上海三农服务热线供稿

水培绿萝如何养?

来自上海市的张先生致电上海三农服务热线,说他上次买了棵绿萝,回家放在水中栽培,前一阵还好,最近开始烂了,应该怎么办呢?

针对此问题,热线专家表示:水培绿萝养护要注意:
(1)由于自来水中没有多少养分,所以需要在水中加入营养剂,一般花鸟市场上都有水培专用营养剂出售。
(2)新鲜的自来水不能直接用来栽培绿萝,需要放置半天左右,待其温度接近室温,水中的氯气挥发干净以后才能使用。
(3)水培绿萝需要经常换水,一般夏天 3~5 天换一次,春秋季节一个星期换一次,冬季 10~15 天左右换一次,切记不要每天换水。
(4)每次换水时,用清水冲洗植物的根部及容器,修剪枯枝败叶及烂根。在正常生长情况下,水培植物会定期烂掉一部分根,再生长出新的根,所以发现有烂根情况时先不要惊慌,将剪子用酒精棉消毒一下,然后把根上腐烂的部分修剪掉就行了,有时也可以把一些老根也修剪掉,以促进新根的生长。

优质鲫鱼养殖技术要点

鲫鱼肉嫩味美,含人体必需氨基酸丰富,既是餐桌上的佳肴,也是传统的药用保健食品,对医治营养性水肿、脾胃虚寒和妇女产后体虚、催乳有较好功效。同时鲫鱼还具有适应性强、食性杂、病害少的良好养殖特性。实践表明,优质鲫鱼在养殖过程中应注意掌握以下技术要点:

购买时分辨鱼种优劣
养殖户在购买鲫鱼鱼种时,应根据主要鲫鱼养殖品种的生物学特征,正确分辨鱼种的优劣,避免上当受骗。
设计好鱼种放养密度
为了降低养殖成本,最好自己培育大规格鱼种。用池塘培育鲫鱼鱼种,每亩放养鲫鱼 0.8 万~1.2 万尾,可以达到养成规格 50~60 克的目的。进行鲫鱼成鱼养殖时,鱼种平均规格为 50~60 克时,每亩放养鲫鱼鱼种 1500~1800 尾最为理想,养成商品鱼规格可达到 350~400 克。
确定搭配品种
培育大规格鲫鱼品种不要搭配草鱼和鲤鱼,而应选择鲢鱼和鳙鱼,数量应占主养鲫鱼的 20%左右,鳙鱼则占鲢鱼的 10%左右。搭配品种的放养时间不宜过早,而且过早投入鳙鱼对鲫鱼驯化的影响更大。
鱼种驯化
鲫鱼是生活在水体中下层的鱼类,主养

鲫鱼的鱼塘,鱼种经驯化后才能够降低饲料成本,增加效益。培育鱼种阶段的鲫鱼驯化相对容易,驯化后的鱼种在成鱼养殖时上浮抢食时间短,便于管理。驯化时在饲料中添加适量添加剂,可以缩短驯化时间,增加鲫鱼摄食面积和数量。密度大,群体数量大,易于驯化,反之则驯化时间长且上浮抢食的百分率低。在密度已确定不能改变时,可以降低池塘水位,相对增大密度,则既利于驯化,又能提高池塘水温,促进鱼生长。搭配鲢、鳙鱼种应在主养鲫鱼不上浮抢食习惯形成之后投放。驯化期的水质宜清瘦不宜浊肥。
饲料粒径和投饲率
鲫鱼饲料粒径的选择标准应就小就不大。一般鲫鱼规格在 10 克/尾以下时,饲料粒径选 0.50 毫米;10~30 克/尾时选 1 毫米;30~75 克/尾时选 1.5 毫米;75~100 克/尾时选 2 毫米;150~300 克/尾时选 2.4 毫米;300 克/尾以上时选 3.2 毫米。鱼的摄食能力受鱼的规格及池塘水温的直接影响,故投饲率应根据

(5)夏天温度高,水分蒸发快,需要经常向叶面喷水,以保持一定的湿度,维持叶面清新。
(6)水培绿萝不能直接放置在阳光下暴晒,养在室内散射光充足的地方就可以了。

上海三农服务热线供稿



据实际情况调整,而不应该一成不变。

鱼病防治
鲫鱼的抗病能力强,但近年来发现了鲫鱼出血性锚头鳋病,虽然此病的发生率不高,但一旦染上任其发展,则会导致鲫鱼大量死亡。该病重症患病鲫鱼主要表现为:浮水漫游(乏力),色泽淡白,鱼体表的腹部、背脊两侧(细鳞部位)可见针状虫体寄生,虫体着生处有绿豆或豌豆大小的充血红斑,病灶部位鳞片松动或脱落,黏液增多,少数形成明显的溃疡。病原体为鲤锚头鳋。

病因:一是清塘不彻底或不清塘,病原体待机孳生;二是投入体表受损伤(或生产操作不慎致使鱼体表受伤)的鱼种,为病原体寄生创造了可乘之机。

预防:在鲫鱼种下塘前 1~2 天用 2.5%敌百虫粉剂全池泼洒。小面积主养池,可在发病季节每半月全池泼洒 90%晶体敌百虫 0.3 克/立方米;大面积鲫鱼混养池,可在鲫鱼生长季节,进行敌百虫挂篓(袋),每月 1~2 次,每次连挂 2 天。

治疗:在养殖中,出现患病征兆时,及时观察检查,确认后可一次性全池泼洒 0.5 克/立方米 90%晶体敌百虫,0.2 克/立方米硫酸亚铁合剂。对于继发性鲫锚头鳋病(或已多次使用敌百虫的池塘),可改用农用敌杀死全池泼洒,用量为每亩水深 1