



源自大自然的馈赠

享受生活 选择丰美

绿丰果园 上海丰美果蔬专业合作社

经营范围：

“真”开心土地领养；林地鸡鸭鹅；特色农家乐；
各类绿色有机蔬菜、大米；田园风光游等等

坚持打造绿色原生态种植环境

“真”开心农田
诚邀你的加入



地址：崇明县横沙乡育贤南路 1068 号 电话：021- 56899531 手机：15026998996 联系人：陈先生 网址：www.fengmeish.com

东方城乡报

三农实用周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

【热线答疑】

上海种植厚皮甜瓜应注意些什么？

厚皮甜瓜的品种有光皮和网纹之分,在上海种植应注意以下几点:

选耐湿、耐弱光照的品种,如新疆农科院的“雪里红”、“9819”、“仙果”、“金凤凰”,上海农科院的“东方蜜一号”、“东方蜜二号”,“哈密红”,上海农技中心“华蜜 0526”等。

上海栽培季节有春秋两茬,早春播种大部分均为光皮厚皮甜瓜,可避开低温、少光照的春节期移栽,秋季 8 月初播种,尽量缩短植株在高温期间的生长时间,并赶在低温到来前果实成熟。

前期棚边膜撩起通风降温,后期保温促瓜提早成熟。

降低大棚湿度,控水,避雨。注意早春因温差大,棚膜内侧易形成众多水滴,滴在叶片上易形成腐烂,发生病害。

结果期绝对禁水,防瓜开裂。

做好防治虫害、白粉病、植株早衰工作。

如何判别君子兰品种的好坏？

目前,作为观赏花卉的君子兰,主要有大花君子兰和垂笑君子兰两种。鉴别君子兰品种是否好,应该看它叶片是否宽、短、厚、直立、光亮、脉纹清晰,花朵是否大、色彩是否鲜艳。

成年君子兰如果叶片宽度达 9 厘米以上,并且叶片长度不超过叶片宽度的 3 倍,这种品种是优良的;叶宽 6~8 厘米,长和宽的比值为 4~6 倍为较好的品种;叶的长宽比值在 7 倍以上为一般品种。从叶片厚度来看,叶片肥厚的为优良品种,最好的品种厚度甚至达 2 毫米;叶片薄的为一般品种。叶直立的品种要比叶斜立或垂弓的优良。叶的先端成圆弧形的为好品种,先端剑尖形或锐尖形的除个别品种较好外,一般均较差。叶色黄绿、嫩绿为上,黑绿、灰绿为下,叶面油亮的要比叶面无光泽的好。最后可看叶脉纹,脉纹明显隆起且间距大的为好品种;脉纹平滑、隐蔽的稍差一些,纵脉、横脉成田字或日字格状的是名品。看花梗,花梗粗圆、花大色红的要比花梗扁细、花小淡红的品种更优良。由根茎来鉴别,即根茎短粗的品种要比细长的品种优良。



林地散养蛋鸡,首先要合理安排投养期:小鸡投苗期最好选在每年农历 2~3 月份,气候开始回暖,渐渐日长夜短,有利万物生长,养到 210 天左右,产蛋高峰在 9~10 月,秋高气爽、产蛋性能最佳的季节,产蛋下降后正逢元旦、春节,淘汰的蛋鸡又可卖个好价。

其次,要掌握好产蛋鸡饲养的几个关键环节:

育雏期的饲养管理(0~28 日龄)。鸡舍内温度控制在 25℃ 左右,保温伞下温度在 30~32℃,随着鸡龄增加,温度每周下降 2~3℃。通风:每天定期开窗、开门 4~6 次。光照时间,开始时 24 小时,随着小鸡长

如何在林地里饲养蛋鸡

大,每周减少 1~2 小时,直至自然光照。光照强度不宜太强,鸡看得见吃食即可。可敞开喂料,也可每天喂料 4~6 次。保持饮水卫生,做好鸡舍的清洁、消毒等,以提高小鸡的成活率。

育成期的饲养管理(29~140 日龄,青年期)。此时小鸡已脱温,长有许多羽毛,可自由采食活动,散养面积开始逐渐放大,整个阶段采用自然光照,让鸡发育体格,提高自身疾病抵抗力,该阶段主要是“生长骨骼拉架子”,因此,要限制喂料,不宜喂富含蛋白质、能量高的配合饲料。每天早、晚 2 次补料饲喂,可改用谷粒饲料如大麦、小米、高粱、玉米、稻谷等。谷粒料不宜轧得太碎,补料量视鸡群发育状况而定,不要喂得太多,七八成饱即可。总之,不要让鸡体养得太肥,否则会丧失产蛋性能。

调教是饲养散养鸡的重要方式。选择补料地点后不要轻易改变,每天 2 次补料前,可用敲鼓、吹箫

等方法,使鸡一听到吃食叫声,就会条件反射跑到采食地等料吃。

为防止传染病,需要全程免疫,特别是 100 天左右的青年鸡,就要进行 1~2 次驱虫,并补种“新城疫”、“禽流感”等疫苗。

140 日龄左右进入产蛋期,要停止驱虫、补种疫苗,根据鸡群每天的产蛋量逐渐增加补料量和饲料内的蛋白质、能量等含量,以后随着产蛋下降相应减少用量。

鸡群产蛋高峰正值秋天,天气早、晚渐冷,日短夜长,鸡群散放不宜太早,让大多数蛋鸡上午在舍内产完蛋再出去。

因此,舍内要有充足的产蛋箱,以减少地面的脏、破蛋等。舍内食槽要有余料,使鸡下完蛋还可吃到料。舍内还要有足够的栖架,让每羽鸡休息好。舍内光照的时间要随产蛋量的上升而增加,最高的每天自然光照加人工光照不少于 17 小时。总之,要想尽办法,使蛋鸡的生产潜力充分发挥出来。

平菇长成团状为什么

平菇长成团状是一种生理性的病害。当平菇原基发生后,由于菌盖分化和发育不正常,形成了菌盖小、菌柄粗的现象,菇农称它为“大根菇”,严重的甚至会长成团状。这种症状发生的原因,主要是冬季

寒冷,菇房内长期关闭门窗或在室内加温,导致菇房内供氧不足;二氧化碳等废气浓度过高,使菇体内养分输送失去了平衡所造成的。

为此,需要解决菇房保温与通风换气的矛盾,使菇房空气保

持新鲜,千方百计降低二氧化碳等废气的积累。措施如下:

在低温季节,要坚持通风换气,在每天气温较高的中午,对菇房进行短时间的通风换气,一般为 15~30 分钟左右。

如果在菇房内用煤炉(炭炉)等加温措施,则应在炉子上加置烟管、烟道,将废气直接排往室外。采取上述措施后,随着气温回暖,改善了菇房的通风换气,这种状况就会自行改变。

梨黑斑病如何防治

梨黑斑病除了危害果实,还会侵害叶片和新梢。该病菌在被害枝梢及落在地面的病果、病叶上越冬,来春又产生分生孢子,侵染发病,5~6 月温暖多雨时,病害会加剧,肥力不足的衰弱梨树会加重感病。控制该病应从以下几方面着手:

1.清除病源,秋冬季清扫越冬病源。将落叶、病果、修剪下的枝条带出果园处理,做好清园工作。

2.加强肥培管理,增强树势,提高抗病能力。

3.药剂防治:冬季喷一次波美 5 度石硫合剂,芽萌动前喷一次波美 1~3 度石硫合剂。发芽后至开花前和谢花后各喷一次 1:2:200 波尔多液。在 5~6 月病害流行期间,可喷加瑞农 1000 倍液或福星 8000 倍液,每 10~15 天喷一次,连喷 2~3 次。

4.套袋保护果实。在 5 月上、

中旬,选用纸质较好的果袋及时套袋,套袋前最好全面喷洒一次杀菌剂,喷药后隔 3~4 小时晾干果面药液,让果实带药入袋。

5.选用抗病品种,淘汰感病品种:“二十世纪”、“博多青”、“明月”、“太白”、“菊水”以及“河北蜜梨”、“东北红梨”等均为感病品种,

应及时淘汰。已栽种的感病品种,可以高接换种,更换抗病品种。还应该选栽一些抗黑斑病的品种,如:“新世纪”、“丰水”、“长寿”、“水晶梨”等等。



上海三农服务热线

冬季猕猴桃管理“莫偷懒”

寒冬已至,对于果树管理方式有了更高的要求,因为这关系到下一个年份是否丰产丰收。严寒会对猕猴桃树体造成一定危害,受冻可能导致树体病变,影响猕猴桃树的生长和产量,猕猴桃不同的发育时期对极端温度的耐受性不同。

渭南市果业研究院院长井赵斌博士,长期从事与猕猴桃相关的科学研究工作,他为广大猕猴桃种植户提出了一些建议。

在冬季修剪方面,应从 12 月中、下旬开始,至次年 1 月结束。采用“V”字型树形,改多主蔓上架为单主蔓上架,少留枝,一次性留长枝,改短截、长枝为多芽少枝修剪。而且在修剪后,及时在创口处涂抹药液,防止病菌侵入。与此同时,对于已结果的果树进行绑蔓时,采用“8”字形方法进行。

在清园涂白方面,井赵斌说:“这个步骤是不能偷懒的,果园清园要从 10 月底或 11 月就应该开始,把园子里的落叶、烂果、废弃果袋、杂草以及病害枝条,及时清除,防止有害病菌在果园滋生,对后期管理造成极大不利。”清园后选用 5 波美度石硫合剂全园喷布,彻底将病虫害消灭在萌芽状态,再采用生石灰灰外加少量石硫合剂掺水混合后对果树涂白,应以主干、主蔓为主。

为预防冻害,果农应在上冻前灌一次封冻水,并在猕猴桃树根茎部培土 30~40 厘米,将树干从地面向上用塑料薄膜包裹 50 厘米左右。若后期树蔓落雪较多,则应及时清理,防止冻伤、压断枝条。

猕猴桃冬季接穗贮藏应按照品种、株系、雌株或雄株的不同,分别打成小捆,加上标签,贮存在湿



润的沙土里或埋在地窖里。特别需要注意保湿、保鲜和防止霉烂。

井赵斌说:“果树管理是一个十分繁琐的过程,每一步都需要果农严格把关执行,入冬之前的

秋施基肥也是十分重要的环节,这决定着来年果树能否有足够的营养健康成长,所以,想要有好的果子,就要做出相应的努力。”

冯玉龙