

三农实用周刊
面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

紫薇的栽植方法及养护要点

水仙花如何增温催花?

水仙花是我国十大名花之一,有凌波仙子、玉玲珑、金銀台、天葱、雅蒜等别称。水仙花外表诱人、曲线鲜明、花身散发出独一无二的香味,具有很高的观赏性。

水仙花有毒吗

首先,水仙花花香是无毒的,但水仙花鳞茎内含有拉丁可毒素,可用于医药,而人误食后会引发呕吐、肠炎,所以水仙花不能随便内服。

水仙花可以摆放在家中的任何地方,特别适宜放在厅、房内,当水仙花开时,整个房间会香气四溢,令人赏心悦目,具有极高的观赏价值。

一般水仙球正常进行水养45-50天可如期开花。而当室温提升到18℃左右时,只需30天就能开花;室温在20℃时,只需25天就可开花;因此可根据需要来确定水仙花的开花日期,有选择性的欣赏到清香美丽的水仙花。

水仙花的增温催花方法

阳光增温。白天移放室外阳光下,或室内朝南阳光充足的玻璃窗前,直至开花为止。

灯光增温。在花盆中罩上塑料罩,开电灯照射,待罩内升温至23℃停止。

电热器增温。开启电热器或将电吹风放置在不至烫伤水仙花的位置,让暖风徐徐吹拂花体,连续数天至花朵绽放。

温水增温。在水盆内放入少量温水,让水温升到12~15℃。

如何延长水仙花开花期

当水仙花全部盛开时,将少量食盐放入盆中,能使水仙花开花期延长。不过,切忌在水仙苞萼待放时就放盐,否则反而会抑制花蕾开放。

如何预防“哑花”

“哑花”是指水仙在水养过程中,花葶中途夭折,花蕾枯萎或花蕾未开先衰的现象。“哑花”现象主要由以下四种原因引起:

水仙球质量差:球体小,花芽发育不良;球体遭受病虫害,根盘干朽,发根少,体质弱。

养护不当:换水不动,光照不足,室温过高,通风不良,造成叶片徒长,花葶瘦弱。此外,换水时碰伤根和花葶,也会导致出现“哑花”。

水养季节不当:如霜降前鳞茎处于休眠期或清明后气温升高时进行水养,均会出现“哑花”。

要防止“哑花”,首先要挑选优质的鳞茎进行养殖,水养时要用干净的水,并且应将自来水先贮存一天再用,再就是要保证水仙光照充足,每日不少于6小时,还要注意室内通风,气温保持在12℃~15℃,天气干燥时,每天要向水仙植株喷水。

(据《养花之师》)

紫薇是一种小乔木,属于长寿树种,其树型不高,常常作为庭院观赏树和街道绿化树,且紫薇对环境的适应性较强,耐干旱耐寒,对土壤的要求也不严,花期能长达3个月之久。那么紫薇如何栽植呢?都有哪些养护要点?

紫薇的栽植方法

移植。在秋季落叶后至春季芽萌动前进行,小苗移植可裸根,大苗移植需带种球。定植时,施堆肥,连灌2次透水,以后适时灌水、松土、除草。紫薇栽植在春季进行,裸根栽植即可。植苗时要保持根系完整。

栽植地点。栽植地点应选择阳光充足、湿润肥沃、排水良好的土壤。

水肥管理。栽前施足基肥,肥料用腐熟的人粪尿、圈肥、厩肥及堆肥均可。定植后的头三年,每年冬季或春季萌芽前在根部穴

状施肥10至15千克(以堆肥、饼肥等有机肥为主),也可酌情施一定的复合化肥。

成活后的紫薇,每年春季要浇返青水一次,以后浇水3至4次,花期浇水1至2次。在华北地区,封冻前浇一次封冻水,雨后再注意排涝。

整形修剪。栽种的紫薇要注意修剪。在栽植较大的紫薇时,栽前要重剪,可按栽培需要定统一高度的主干,把上部树冠全部剪掉,这样新发的树冠长势旺盛且整齐美观。

在紫薇幼树生长期,应随时将茎干下部的侧芽摘除,以使顶芽和上部枝条能得到较多的养分而健壮生长,早日形成完整树冠。在生长季节,应及时剪除残花及枝条,促发新枝以延长花期,紫薇花序开在新枝顶端。在落叶

后要疏剪徒长枝、细弱枝、病虫枝和枯萎枝。

紫薇的养护要点

土壤。紫薇有着较强的环境适应力,有条件的可以选用深厚的肥沃砂质土壤进行栽培,最有利于紫薇的生长。

浇水。紫薇抗旱忌涝,可在每年的春季萌动前浇一次返青水,在秋季落叶后浇一次冻水,其他时间注意“不干不浇”。春旱时需浇水1~3次;雨季时的排涝工作要做好,避免积水引起的烂根;秋天一般不用进行浇水。

光照。紫薇生长需要充分光照,否则会使开花期出现花少甚至无花的情况,更严重的会使整株生长衰弱。

温度。长成后的紫薇植株抗寒性很强,但对幼苗的防寒保温工作必须做好。培养达到三年生

以上后就可以停止保温了。

施肥。和浇水的时间相仿,在春季萌动前施肥一次,在秋季落叶后施肥一次。可以施以人粪尿或麻酱渣,能够促使来年植株的生长更加旺盛,花期开花更加茂盛鲜艳。

修剪。由于紫薇的花序在当年的新枝顶端着生,所以要注意对一年生的枝条进行重剪回缩,利于集中养分,使枝条生长更健壮。徒长枝、下垂枝、病虫枝、干枯枝、纤细枝与内生枝都要剪除,幼树时植株主干下端长的侧生枝也要及时剪掉,减少养分的消耗确保在植株主干的上部能有良好的树冠形成。

虫害。紫薇易被绒蚧、黄刺蛾和大蓑蛾等虫害侵害,应及时地采取喷药等措施来防治。

(据《农业说坛》)

黄杨盆景栽培方法



很多人养不好黄杨盆景,其实黄杨盆景栽培方法很简单,在养护时为其提供肥沃的土壤并要1~2年换盆一次,春秋2~3天浇水一次,土壤表面不干不浇水,还要每月少量施加氮肥为其补充养

分,为黄杨提供充足的散射光和20℃~30℃的温暖环境,及时修剪枝叶,做好病虫害防治,放在通风处就可以了。

肥沃土壤

黄杨是一种喜欢酸性土壤的

植物,在栽培黄杨盆景时要为其提供适合的肥沃土壤,可以选择到稻田土、腐殖土和蛭石进行2:2:1的混合配制,并且在种植后要1~2年进行一次翻盆换土,让它可以更好地生长。

适量浇水

适量浇水进行水分补充,对于黄杨盆景的旺盛生长十分重要。在养护时一般春秋可以2~3天浇水一次,夏季要每天浇水,冬季则可一周浇水一次,平常浇水时注意观察盆土表面是否干燥,未干时不要浇水。

少量施肥

在施肥方面,黄杨盆景并没有很大的养分需求,只需要在黄杨的生长旺盛期少量施肥补充养分即可。主要是每月施加一次稀薄的氮肥肥液,并且可在种植时在土壤中掺杂少量的豆饼肥来做基肥。

光照适宜

提供适宜的光温也是黄杨盆

景栽培方法之一,养护时将黄杨摆放在散光下,可使它生长的更为繁茂,并且要将其放在温暖环境中,保持温度在20℃~30℃左右,可以让黄杨旺盛的进行生长。

枝叶修剪

黄杨盆景在养护时还要不时进行枝叶的修剪,使其更加美观具有观赏价值。主要将其过于长的枝条适当剪短,还要将多出来的分枝剪除,并做好整体的枝叶造型修剪,让黄杨盆景能够保持良好的株型。

病虫害防治

要让黄叶盆景始终旺盛美丽,还要做好病虫害的防治,主要在介壳虫、蚜虫等害虫的幼虫期就要做好防治工作,喷洒相关的杀虫药液,使黄杨盆景免受病虫害威胁,并且要将其放在通风环境,使其健康生长。

(据《花草坛》)

盆栽栀子花的方法要点

盆栽栀子花喜光,但夏季适宜摆放散光处。

土壤。盆栽栀子花喜欢在含腐殖质较多的酸性土中生长,要注意土壤的渗水、透气性。

温度。盆栽栀子花在18℃~28℃是其最佳生长温度,开花适温为22℃~28℃,适当通风。

光照。栀子花喜充足的光照,特别在春秋两季,每日要给予5小时的日照,不然对其生长和冬

季越冬不利。夏季忌中午强光暴晒,否则会使叶片变黄。要放置散光处养护,透光率达40%~50%为宜。入冬放置室内阳光直射处。

施肥。栀子花不是十分喜肥的花卉,但是由于它生长旺盛,又受盆土养分有限的影响,所以需要合理补充肥料。开花以前可以半月左右施一次液肥。每隔10天左右施一次氮磷钾肥或饼肥,在施肥前1天应停止浇水,施肥

的这天同时浇1次透水,入秋后需要控肥。

浇水。盆栽栀子花喜大水,春天因风多、风大、空气干燥和降雨稀少,每3天浇水一次,并在放置盆花的周围每日早晚要洒水,以提高空气湿度。夏季入伏后天气炎热,以软水浇灌为宜,因硬水中含钙、镁盐类较多,这对栀子花的生长十分不利,轻则枝叶变黄,重则很快死去。

为了克服土壤和水质的碱

性,在生长季节里每周浇一次矾肥水,使盆栽栀子花保持枝叶浓绿。冬季应控制浇水,不干不浇,长期含水量过多,易造成烂根死亡。

摘心。为了调节和控制盆栽栀子花的生长,使株形优美和促进开花,在春季旺盛生长将停止时,把新枝顶端摘去,促使枝条基部的腋芽饱满和花芽的形成。

(据《晨泽绿植》)

薄荷种植方法与技巧

薄荷喜湿不耐旱,适合在疏松透气、肥沃的土壤中生

长。种植薄荷时,需要给予薄荷充足的光照。薄荷是喜光的植物,需要保证每天能接收到全天的阳光,在夏季时需要注意,中午温度高,太阳光过于强烈,薄荷在这个时候不能被阳光直射,需要

进行遮光处理。

想要让薄荷长得好,要注意在春季和夏季每两个月进行一次修剪。每当薄荷长出新芽时,观察一下新芽是否长在主干上,对于主干顶端的芽需要及摘除,解除薄荷的顶端优势,让薄荷将营养用于长叶子。

种植方法:一般2~3天浇一次水,不要让土壤出现积水,每个月施用一次氮磷钾1:1:1复混肥料,每次施用稀释100倍;薄荷要进行全光照,在夏季中午要进行遮光。种植技巧:春季和夏季每两个月进行一次修剪,打顶摘心,每年还需要换一次土。

薄荷生长快速,对养分消耗较大,长时间种植会导致土壤营养不均衡,施肥也难以补救,一般需要每年换一次土。养护薄荷需要使用排水性好的土壤,切记不要使用黏土,会影响其根部呼吸的生长发育。

(据《霸耀科技》)