

2025 年度超级稻品种确认会召开

持续强化超级稻品种示范推广

日前,全国农业技术推广服务中心组织召开了2025年度超级稻品种确认会。按照《超级稻品种确认办法》相关规定,组织从事水稻育种、栽培、推广工作的9名专家,从产量特征、品质抗性、推广成效等方面对申报品种进行综合评价,讨论确认了2025年新增超级稻候选品种名单,研究了退出超级稻

冠名的品种建议名单。农业农村部科学技术司相关处室负责同志参加会议。

近年来,全国水稻科研推广优势力量紧紧围绕农业农村部部署要求,紧盯关键环节,优化技术路径,在超级稻重大品种培育、配套技术集成、科技协同创新等方面取得了重大突破。超级稻冠名品种稳定在130个左右,配套综

合栽培技术不断完善,全国累计推广种植超过22.5亿亩,年推广面积占水稻种植面积约30%,亩均增产66公斤,示范带动全国水稻大面积均衡增产。

会议认为,要锚定加力落实新一轮千亿斤粮食产能提升任务目标,持续强化超级稻品种示范推广,深化综合栽培技术集成配套,充分发挥超级稻

在产量潜力挖掘、模式集成示范、均衡带动增产的技术引领作用。要加快研究修订超级稻品种确认办法,科学严谨超级稻品种确认过程,持续规范超级稻品种示范推广应用工作,确保好品种选出来、好技术推出去、好成效宣传开,为水稻大面积单产提升提供科技支撑保障。(来源:全国农技推广网)

农事

如何用箩筐保温育春鸭?

准备干净、干燥的箩筐数只,内铺干燥的短稻草10~15厘米,箩筐外用麻袋包紧,箩筐上平放几块竹片,吊一支温度计,使温度计底部距稻草15厘米左右。每只箩筐可放1周龄内雏鸭20~30只或1~2周龄雏鸭15~20只,箩筐上面盖旧衣服,以掀、盖衣服调节箩筐内温度。温度要求1周龄25℃~30℃,两周龄20℃~25℃。如遇寒潮,还可在箩筐外再围薄膜(不宜长期围),或在底部稻草里放一个盛热水的玻璃瓶。晚上将箩筐挂起,可防鼠害。

由于密闭饲养,箩筐里的稻草要每天换两次,保持干净、干燥。如白天气温在20℃以上,应将雏鸭围在地面阳光下,让其活动。趁此时将箩筐、垫草、麻袋分离,分别晒太阳。两周龄以内的雏鸭喜挤堆,长期如此会引起死亡。因此每隔1小时左右要扒开一次,特别是夜间要留神,待鸭长至不再挤堆时为止。雏鸭发出轻轻哀叫声,一般是表示寒冷;大群轰动、张口呼吸,多是受热或饥饿所致,应及时处理。

箩筐保温育雏鸭,只能早养,不能让鸭子下水游泳。一般在进食后让其在塑料薄膜上饮一点水,而饲料保持湿润即可。箩筐保温育雏鸭期间,因外界气温低,不能放牧,必须吃专备的雏鸭米。雏鸭米可按下列配方自配:碎米50%、麦粉10%、玉米11%、棉籽饼3%、菜籽饼4%、豆饼14%、鱼粉5%、骨粉1.8%、贝壳粉1%、食盐0.2%,另加切碎的青菜叶,每天喂5次。将湿粉料撒在干净的水泥地面或塑料布上,将箩筐上的旧衣掀开,让筐内外空气对流几分钟,再放鸭采食。采食完后再捉鸭进筐。

两周龄以后,鸭体重在170克左右,在15℃~18℃的环境下能较好地生长。此时可将其转移到铺有干草的温暖鸭舍内饲养,并在每餐后饮水和洗浴。如果天晴,可到大田放牧。由于在田野里雏鸭可采食到许多动物性饲料,配合饲料中可以不用鱼粉,减半使用饼粕类饲料。

春季如何管理好蜂群

春季是蜜蜂疾病的多发季节,早晚温差大,蜜粉源稀少,蜜蜂又刚刚经历完越冬期,体质虚弱,蜂群极易发病,此时必须做好以下几方面的工作:

选择适宜的放蜂场地

蜂场环境直接影响着蜜蜂的生存和发展,选择适宜的放蜂场地尤为重要。通常我们要选择背风向阳、有清洁水源、温度、湿度和有各种蜜粉源植物可适合蜜蜂繁殖、采集的良好自然环境。要远离有毒有害有噪音的厂矿,不靠近铁路、公共场所等,以防止人为和机械环境损害蜜蜂。

蜂场消毒

为预防蜂群各种疾病的交叉感染,进行场地消毒非常重要,在蜂群摆放前需打扫场地卫生、拔除杂草,然后对蜂场地面撒石灰粉消毒或用5%的石

灰水喷洒场地。石灰水以1份生石灰加1份水制成消石灰,再加水成10%~20%溶液,需要注意的是石灰水需要现用现配。养蜂用具和巢脾采用硫磺熏蒸或者消毒剂喷刷的方法进行消毒灭菌,处置完后等药物气味散尽再给蜂群使用,防止给蜜蜂带来伤害。

注意保暖和预防性用药

春季气温低,繁殖条件不好,蜂群开始繁殖后应该紧脾缩巢,让蜜蜂密集。低于2框蜂的群,蜂脾关系为蜂多于脾,3框蜂以上的群,蜂脾关系为蜂略多于脾或蜂脾相称,防止寒潮天气蜜蜂聚团,外围子脾没有蜜蜂保护,发生幼虫冻伤死亡引起拖子或幼虫病。小群还要内外保温帮助蜜蜂抗寒,大群适当进行箱外保温。根据天气和蜂群大小扩大或缩小巢



门。

蜂群排泄后撤出群内的子脾,用水剂杀螨剂按使用说明,给蜜蜂治两次螨,减少蜂螨对蜜蜂的危害。

注意饲料安全

春季需要给蜂群哺喂蜂蜜和花粉,哺喂的蜂蜜最好是上

一年自己蜂场贮存的蜜脾。需要喂白砂糖时,应购买正规厂家生产的产品,白砂糖的贮存要防止污染。喂花粉时也同样要先用自己蜂场生产的花粉。需要购买时,要买了解情况、无病蜂场的花粉。

(来源:陕西农村网)

春季茶园的管理要点



春季是一年中名优茶生产的关键季节,是茶叶生产增值、提高经济效益的关键时期。做好春季茶园管理事关广大茶农的切身利益,是取得全年茶叶优质高产的关键所在。

适时撤除越冬防护设施

幼龄茶园要及时退去越冬培土,给茶树的生长活动提供条件。投产园撤除防护后,对茶园普遍进行一次浅耕松土,以利地温回升,保蓄水分,减

轻土壤板结。铲除冬春杂草,减少养分与水分的损失,有利于茶树生长,促进春茶早发。

合理修剪

幼龄茶园,根据树龄进行定型修剪。第一次定型修剪在茶苗移栽定植时进行,离地15~20厘米处修剪,只剪主枝,不剪侧枝;第二次定型修剪是茶苗栽后第二年2月底至3月初进行,一般离地25~30厘米处修剪;第三次定型修剪

是栽后第三年进行,离地35~40厘米处修剪。

投产茶园修剪时要掌握宁浅勿深,避免剪去尚能发芽的枝条,造成不必要的损失。对于成龄茶园及以采高档名优茶为主的茶园,宜将春茶前期的修剪推迟到春茶采制结束后进行,即:剪去蓬面5~7厘米的受冻干枝和鸡爪枝。

衰老园根据树龄、树势进行深修剪,更新树冠。

科学水肥管理

春茶高产、质优的关键措施是重施有机肥,早施追肥。早春施肥能提高茶树贮藏水平,为萌发创造良好的物质基础。生产上要根据茶树长势施用肥料,一般以速效氮肥为主,必要时适当配施磷钾肥和其他元素有机肥料。施肥时间宜早不宜迟,在茶树根部周围开沟施用,边施边盖土,防止肥效损失。

受冻害茶园在春季要增加肥水投入,以有机肥为主,合理搭配氮磷钾肥,同时及时灌溉,保证树体生长需要。

及时浇水,保证茶树萌发

及生长需要。春季是茶树需水高峰时期,3月上中旬要根据土壤墒情及茶树萌发情况,结合施肥浇好催芽水,促进发芽和生长。浇水后要及时中耕,促使地温尽快回升,以达到养根壮树、促进萌发的目的。

适时采摘

当茶树有10%左右的芽叶达到采摘标准时即可开园采茶。在春茶早期,茶叶品质优异,经济效益较高,应及时采摘,以抓质量为主,每隔3~5天采一次;中期抓产量,每隔4~5天采一次;后期采养结合。鲜叶采摘后,及时运回加工厂进行加工。

防治病虫害

春季是黑刺粉虱、绿盲蝽象、茶蚜虫等病虫害的高发时期,建议可在茶园技术指导下进行用药防治。

谨防“倒春寒”

茶树萌芽期要注意“倒春寒”。在低温寒潮来临之前,采取遮阳网覆盖、喷水、熏烟等方法可有效预防晚霜对茶园的侵害。

(来源:陕西农村网)